



L'anthophore plumeuse



Gewone sachenbij



Le saviez-vous ?

Le mâle de l'Anthophore plumeuse a des pattes avant allongées et couvertes de longues soies, ce qui a donné à l'espèce le nom de "plumeuse".

Ces soies joueraient le rôle de signal visuel durant la reproduction. En effet, lors de l'accouplement, le mâle tapote ses pattes plumeuses sur la tête et les antennes de la femelle en une mystérieuse chorégraphie dont la fonction précise est encore inconnue.

Wist je dat?

Het mannetje van de Gewone sachenbij heeft lange haren aan de middelste poten. Deze doen wat denken aan de wolvenstaarten die indiaanse opperhoofden, ook wel sachems genoemd, als beenversiering droegen.

Deze beharing speelt een belangrijke rol tijdens de paring. Mannetjes wrijven ermee over de kop en de antennes van het vrouwtje in een mysterieuze dans waarvan de functie nog onbekend is.

Qui suis-je?

L'Anthophore plumeuse est une abeille robuste et poilue, son allure amenant souvent à la confondre avec les bourdons. Mais contrairement aux bourdons, cette espèce est solitaire. La femelle creuse son nid dans les talus de terre ou dans les joints des murs en pierre sèche. Elle y réalise des galeries verticales, au bout desquelles se trouvent plusieurs cellule individuelles qui accueillent sa progéniture.

Wie ben ik?

De Gewone sachenbij is een forse en sterk behaarde bij, die wat wegheeft van een hommelm. In tegenstelling tot hommels leeft deze soort solitair. Vrouwtjes graven hun nesten in steilwanden of in voegen van oude (stapel)muren. Na een kort horizontaal stukje maakt de gang een hoek van 90° en loopt verder verticaal. De nestgang eindigt in enkele nestcellen waarin de larven zich voeden met het verzamelde stuifmeel.

Quand m'observer ?

L'Anthophore plumeuse est une espèce printanière que l'on peut observer dès les premiers beaux jours car elle passe l'hiver sous forme d'adulte. Elle butine dans les jardins les fleurs à longue corolle jusqu'en juin.

Wanneer kan je me zien?

De Gewone sachenbij is actief vanaf het vroege voorjaar. Ze kan al waargenomen worden op de eerste warme dagen van het jaar, aangezien de soort de winter doormaakt als volwassen dier. Ze is te vinden tot begin juni en bezoekt vooral bloemen met een smalle, lange bloembuis zoals longkruid, smeerwortel, dovenetel en hondsdraf.