

L'insecte du mois - Het insect van de maand



© Pieter Vantieghem

Cheilosia albipila

Le saviez-vous ?

Cette espèce passe beaucoup plus de temps à l'état larvaire, invisible à l'abris dans sa plante hôte, que sous sa forme ailée d'adulte telle que nous la voyons fréquemment.

Wist je dat?

Deze soort heeft een lang larvaal stadium, dat verborgen blijft in de waardplant. De volwassen vliegen leven veel minder lang.

Cheilosie orangée



Tweekleurig gitje

Avril 2018 - April 2018

Qui suis-je?

La Cheilosie orangée est un syrphe qui fréquente les zones humides, qu'elles soient boisées ou ouvertes, comme les prairies ou les marais. Elle ressemble à certaines abeilles poilues et orangées comme les andrènes, que l'on peut observer à la même période. Elle est présente dans toute l'Europe et jusqu'en Sibérie mais se limite au sud au niveau des Pyrénées. La larve de la Cheilosie orangée se nourrit sur les chardons et en particulier sur le Cirse des marais. Les oeufs sont pondus à la base des feuilles, près des racines et la larve se nourrit ensuite de la plante. La larve passe l'hiver au repos, dans la plante, et émerge sous sa forme ailée au début du printemps.

Quand m'observer ?

On observe la Cheilosie orangée au printemps, du mois de mars au mois de mai, principalement sur les saules qui sont en fleurs à cette époque. Au mois de mars, la présence de saules est capitale car il y a peu d'autres nourritures disponibles pour cette espèce printanière.

Wie ben ik?

Het tweekleurig gitje is een zweefvlieg die vaak te vinden is in vochtige gebieden. Zowel beboste als open gebieden, zoals weiden en moerassen, worden bewoond. Ze lijkt op een harige, oranjebruine, bij en heeft wat weg van zandbijen die ook in het voorjaar actief zijn. Ze komt voor in heel Europa en tot in Siberië. In het zuiden ligt de grens van haar verspreidingsgebied aan de Pyreneën. De larve van het tweekleurig gitje voedt zich met distels (vooral met kale jonker). De eieren worden gelegd onderaan de bladeren, dicht bij de wortels, waar de larve zich met de plant voedt. De larve brengt de winter al slapend door, binnen in de plant, en komt in de lente tevoorschijn als vlieg.

Wanneer kan je me zien?

Je vindt het tweekleurig gitje van maart tot mei, vooral op bloeiende wilgen. Het is van groot belang dat er voldoende wilgen in het vroege voorjaar in bloei staan, want het voedselaanbod voor deze vroege soort is zeer beperkt.