



© Morgane Folschweiller

Landkaartje



Carte géographique

*Araschnia levana*

## Wist je dat?

*Wanneer het eitjes legt, stapelt het landkaartje die op elkaar op zodat ze in kleine kettinkjes aan de achterkant van de brandnetelbladeren blijven hangen. Dit is de enige dagvlinder die dit zo doet.*

## Le saviez-vous ?

*Lorsqu'elle pond, la Carte géographique, empile ses oeufs en chaînettes suspendues au revers des feuilles d'orties, caractère unique chez les Papillons "de jour".*

## Wie ben ik?

Het landkaartje is een vlinder uit de familie van de Nymphalidae. Het komt op vele soorten plaatsen voor, maar heeft een voorkeur voor alluviale valleien en bossen waar het zijn waardplant, de grote brandnetel, in grote hoeveelheden aantreft. De achterkant van zijn vleugels vertoont een tekening die sommigen aan een spinnenweb doet denken (vandaar zijn Latijnse naam: "Araschnia") en anderen dan weer aan een netwerk van wegen, een "landkaart" dus.

## Qui suis-je?

La Carte géographique est un papillon de la famille des Nymphalidés. Elle fréquente de nombreux milieux avec une préférence pour les vallées alluviales et les massifs forestiers où elle trouve sa plante hôte en grandes quantités, la Grande Ortie. Le revers de ses ailes arbore un dessin évoquant pour certains une toile d'araignée (référence que l'on retrouve dans son nom latin : "Araschnia") et pour d'autres un réseau de chemins qui rappellent une "carte géographique".

## Wanneer kan je me zien?

Het landkaartje vliegt in twee generaties die een uitzonderlijk door de seizoenen bepaald dimorfisme vertonen. De eerste generatie, in de lente, is oranje met zwarte vlekken op de voorkant van de vleugels. De tweede generatie, in de zomer, is zwart met witgekleurde banden. De vliegperiode duurt van april tot september.

## Quand m'observer ?

La Carte géographique vole en deux générations qui font preuve d'un dimorphisme saisonnier remarquable ! La première, printanière, est de forme orangée à tâches noires à l'avant des ailes. La seconde, estivale, est de forme noire à bandes blanches. La période de vol s'étend ainsi d'avril à septembre.